Première approche des fonctions et leurs domaines

Exercices préparatoires

Complète les phrases suivantes et donne les exemples adéquats :

➤ Pour connaître la croissance d'une fonction du premier degré,
je regarde **le coefficient de x (coefficient de direction)**

s'il est **positif**, $f(x)$ est **strictement croissant**

exemple : $f(x) = 10x - 8$

s'il est **négatif**, $f(x)$ est **strictement décroissant**

exemple : $f(x) = -10x - 8$

➤ Pour connaître la concavité d'une fonction du second degré,
je regarde **le coefficient de x^2 (a)**

s'il est **positif**, $f(x)$ est **à concavité vers le haut**

exemple : $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$

s'il est **négatif**, $f(x)$ est **à concavité vers le bas**

exemple : $f(x) = -3x^2 - 5x + 1$

➤ Pour calculer les points d'intersection de $f(x)$ avec l'axe OX,
je **remplace « y » ou « f(x) » par « 0 »**

et je calcule les **racines**.

Les points s'écrivent alors **(racines, 0)**

exemple : $f(x) = 2x^2 + 5x$

$$2x^2 + 5x = 0$$

$$x(2x + 5) = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } x = -5/2$$

points d'intersection avec OY : **(0,0)** et **(-5/2,0)**

Pour connaître la parité d'une fonction,

je **remplace « x » par « -x » dans la fonction**

Si $f(-x) = f(x)$ alors $f(x)$ est **pair** et son graphique est symétrique par rapport à **l'axe OY**

exemple : $f(x) = 3x^4 + 2x^2 - 9$

Si $f(-x) = -f(x)$ alors $f(x)$ est **impair** et son graphique est symétrique par rapport à **l'origine (0,0)**

exemple : $f(x) = \frac{5x}{3x^2 - 1}$

➤ Pour connaître l'image d'une fonction d'après son graphique,

je **projette le graphique sur l'axe OY**

exemple : $f(x) = \sqrt{x-1} - 5$ admet comme image $I = [-5, +\infty[$

Les fonctions du troisième degré peuvent admettre un point d'inflexion (P.I.)

Pour $f(x) = x^3$ le P.I. est **(0,0)**

Le P.I. suit le même déplacement que le graphique

exemples : $f(x) = (x - 5)^3 + 2$

Le P.I. se translate de **5 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut.**
et devient donc **P.I. (5,2)**

Les fonctions de type $1/x$ sont caractérisées par leurs asymptotes (A.V et A.H)

Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, on a A.V. $\equiv$ **$x = 0$** . et A.H. $\equiv$ **$y = 0$**

Les asymptotes. suivent les mêmes déplacements que le graphique

exemples : $f(x) = \frac{1}{x-4} + 3$

L'A.V.. se translate de **4 unités vers la droite.**

et s'écrit donc A.V. $\equiv$ **$x = 4$** .

L'A.H.. se translate de **3 unités vers le haut**

et s'écrit donc A.H. $\equiv$ **$y = 3$** .

Les domaines :

Il existe trois types de condition d'existence :

Si la fonction s'écrit $f(x) = \frac{n(x)}{d(x)}$ alors il y a une condition d'existence qui est : **$d(x) \neq 0$**

Si la fonction s'écrit $f(x) = \sqrt{a(x)}$ alors il y a une condition d'existence qui est : **$a(x) \geq 0$**

Si la fonction s'écrit $f(x) = \frac{n(x)}{\sqrt{b(x)}}$ alors il y a une condition d'existence qui est : **$b(x) > 0$** ..

S'il y a à la fois, des dénominateurs et des racines d'indice pair, il y aura

plusieurs conditions. La domaine s'obtiendra en reprenant les différentes conditions sur la « ligne des réels »

Exemple : $f(x) = \frac{\sqrt{x-4}}{(x-5)\sqrt{6-x}}$

Il y a :

une racine carrée au numérateur d'où la C.E. : $x - 4 \geq 0$

un polynôme au dénominateur d'où la C.E. : $x - 5 \neq 0$

une racine carrée au dénominateur d'où la C.E. : $6 - x > 0$

Après résolution des trois conditions, on obtient :

$$\begin{cases} x \geq 4 \\ x \neq 5 \\ x < 6 \end{cases}$$

ce qui donne $D = [4,5[\cup]5,6[$

Exercices :

Pour chaque fonction, coche la bonne catégorie de conditions d'existence et précise s'il faut faire un tableau de signes. Justifie

f(x)	... ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	---------	----	-----	----------

exemple :

$$\sqrt{x^2 - 7}$$

X
car rac carrée
au num
 $x^2 - 7 \geq 0$

oui car C.E. = inéquation
du 2^{ème} degré

x		$-\sqrt{7}$		$\sqrt{7}$	
	+	0	-	0	+

$$D =]-\infty, -\sqrt{7}] \cup [\sqrt{7}, +\infty[$$

Fais les autres exercices sur le même modèle

$$f_1(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

$$f_2(x) = \sqrt{7 - 8x}$$

$$f_3(x) = \frac{2x}{\sqrt{-x^2 + 3x - 2}}$$

$$f_4(x) = \sqrt{\frac{2x}{-x^2 - 4}}$$

$$f_5(x) = \sqrt{\frac{x+5}{2x-11}}$$

$$f_6(x) = \frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{13-x}}$$

$$f_7(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x-8}$$

$$f_8(x) = \frac{3x+1}{2x\sqrt{x+6}}$$

$$f_9(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{4 - x^2}}$$

$$f_{10}(x) = \sqrt{\frac{x^3 - 2x}{x+5}}$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

solutions :

$$\sqrt{9-x^2}$$

X
car rac carrée
au num
 $9-x^2 \geq 0$

oui car C.E. = inéquation
du 2^{ème} degré

x	-3	3
-	0	+ 0 -

$$D = [-3,3]$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\sqrt{7-8x}$$

X
car rac carrée
au num
 $7-8x \geq 0$

pas obligatoire car C.E.
est ineq du 1er degré

$$\begin{aligned} -8x &\geq -7 \\ 8x &\leq 7 \\ x &\leq 7/8 \end{aligned}$$

;

$$D =]-\infty, \frac{7}{8}]$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\frac{2x}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$$

X
car rac carrée
au dénom
 $-x^2+3x-2 > 0$

oui car C.E.
est ineq du 2ème^e degré

x	1	2
-	0	+ 0 -

$$D =]1,2[$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\sqrt{\frac{2x}{-x^2-4}}$$

X

car une rac carrée

$$\frac{2x}{-x^2-4} \geq 0$$

oui car C.E.

est une fraction

recherche des racines :

$$2x = 0 \quad -x^2 - 4 = 0$$

$$x = 0 \quad -x^2 = 4$$

$$x^2 = -4$$

impossible d'où pas de racine

tableau de signes :

		0		
2x	-	0	+	
-x ² - 4	-	-	-	

	+	0	-	
--	---	---	---	--

$$D =]-\infty, 0]$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\sqrt{\frac{x+5}{2x-11}}$$

X

car une rac carrée

$$\frac{x+5}{2x-11} \geq 0$$

oui car C.E.

est une fraction

recherche des racines :

$$x + 5 = 0 \quad 2x - 11 = 0$$

$$x = -5 \quad 2x = 11$$

$$x = 11/2$$

tableau de signes :

		-5		11/2	
x + 5	-	0	+	+	+
2x-11	-	-	-	0	+

	+	0	-		+
--	---	---	---	--	---

$$D =]-\infty, -5] \cup]11/2, +\infty[$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\frac{3x+1}{2x\sqrt{x+6}}$$

1° $x \neq 0$ car dén

2° $x + 6 > 0$ car rac au dén
 $x > -6$

$$D =]-6,0[\cup]0,+\infty[$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\frac{\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{4-x^2}}$$

1° $x^2 - 1 \geq 0$ car rac au num
tableau car 2^{ème} d

$$x^2-1 \quad + \quad -1 \quad - \quad 1$$

$$x^2-1 \quad + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad +$$

$$x \in]-\infty,-1] \cup [1,+\infty[$$

2° $4 - x^2 > 0$ car rac au dén
tableau car 2^{ème} d

$$4-x^2 \quad - \quad -2 \quad + \quad 2$$

$$4-x^2 \quad - \quad 0 \quad + \quad 0 \quad -$$

$$x \in]-2,2[$$

Deux conditions que l'on reporte sur la ligne :

$$D =]-2,-1] \cup [1,2[$$

f(x)	 ≠ 0	>0	≥ 0	tableaux
------	----------	----	-----	----------

$$\sqrt{\frac{x^3 - 2x}{x+5}}$$

$$\frac{x^3 - 2x}{x+5} \geq 0 \text{ car rac carrée}$$

tableau car fraction

racines : $x^3 - 2x = 0$
 $x(x^2 - 2) = 0$
 $x = 0$ ou $x = \pm\sqrt{2}$

$x = -5$

		-5		$-\sqrt{2}$		0		$\sqrt{2}$	
x	-	-	-	-	-	0	+	+	+
$x^2 - 2$	+	+	+	0	-	-	-	0	+
x+5	-	0	+	+	+	+	+	+	+
	+	/	-	0	+	0	-	0	+

$$D =]-\infty, -5[\cup [-\sqrt{2}, 0] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$$